INFOVET LABTEST

O DIAGNÓSTICO CLÍNICO VETERINÁRIO POR QUEM FAZ

Artigos Colecionáveis

Nº 4 . janeiro de 2020

A Labtest é a maior indústria brasileira do segmento de diagnóstico in vitro. Uma empresa moderna, certificada e reconhecida, nacional e internacionalmente, tanto pelo rigor tecnológico e científico quanto pela produção de conhecimento e inovação. O Infovet Labtest é uma prova disso. Trata-se de uma série de artigos colecionáveis com diferentes assuntos e informações do universo veterinário. Tudo isso porque, além de prover soluções que auxiliam no diagnóstico, a Labtest investe no conhecimento.

GAMA GT URINÁRIO:

MARCADOR PRECOCE DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM CÃES E GATOS.

O rim possui importante papel na manutenção do equilíbrio hídrico, eletrolítico, homeostático e ácido-básico, elimina produtos de excreção do metabolismo corporal e controla as concentrações da maioria dos constituintes do sangue e dos líquidos intracelular e intersticial. Além disso, o rim sintetiza hormônios relacionados com a eritropoiese e com o controle da pressão sanguínea.

As doenças renais são importantes doenças na Medicina Veterinária, com prevalência em cães de 0,5 a 7% e em gatos de 1,6 a 20% (Lund et al., 1999; Watson, 2001). Acredita-se que 30% dos gatos acima de 15 anos de idade apresentem evidências de disfunção renal (Elliott e Barber, 1998). A insuficiência renal aguda pode ocorrer devido a isquemia renal, agentes tóxicos ou infecciosos, afetando tanto o glomérulo quanto a porção tubular do néfron. **A detecção precoce da insuficiência renal aguda é de grande importância, pois com a instituição do tratamento precoce é possível atenuar ou inibir o dano renal e evitar que o paciente evolua para o óbito ou para a insuficiência renal crônica, doença de caráter irreversível.**

MARCADORES TRADICIONAIS DE DOENÇA RENAL:

• Uréia e Creatinina

A ureia e creatinina são subprodutos do metabolismo do nitrogênio e que, fisiologicamente são eliminadas pelos rins, assim, a quantificação dessas substâncias é amplamente utilizada para a identificação da insuficiência renal em cães e gatos. A creatinina é um melhor indicador da taxa de filtração glomerular do que a ureia, pois a sua velocidade de produção e excreção são relativamente constantes e pouco influenciadas por fatores extrarrenais em comparação a ureia.

InfoVET - Informativo técnico veterinário da Labtest

Labtest Diagnóstica S.A.
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600 - Lagoa Santa
Minas Gerais - Brasil. CEP 33400-000
Fone +55 (31) 3689-6900. SAC (DDG) 0800 031 34 11
E-mail: sac@labtest.com.br
www.labtest.com.br

Grupo Científico Labtest:
Presidente: Dra. Eliane Lustosa Cabral
Gerente de Mercado: Ana Luiza Maggi Marcato
Gerente de Pós-Vendas: Ronan Martins Pereira
Coordenadora de PeD: Patrícia Donado Vaz de Melo
Coordenadora Controle da Qualidade: Pollyanna Fernandes N. Pimentel
Especialista de Produto/Autora: Juliana Bicalho
Especialista de Produto: Bárbara Patrícia de Moraes

Na insuficiência renal há o aumento da ureia e creatinina séricas, denominada azotemia e que, de acordo com a localização da lesão, pode ser classificada como azotemia pré-renal, renal ou pós-renal. A dosagem de ureia e creatinina possui como vantagens o baixo custo, praticidade e elevada especificidade, pois poucos fatores extrarrenais podem influenciar no aumento de ambas as substâncias. Por outro lado, **não são considerados marcadores precoces de doenças renais, pois a azotemia só ocorre quando há um comprometimento superior a 75% dos néfrons renais.**

• Densidade Urinária

A densidade específica urinária é um importante parâmetro para avaliar a capacidade dos rins em concentrar ou diluir a urina. A determinação da densidade urinária deve ser realizada utilizando refratômetro, pois a utilização de tiras reagentes comumente está associada a resultados falso-positivos e falso-negativos.

A densidade urinária deve ser interpretada em conjunto às concentrações de ureia e creatinina, visto que o grau de hidratação, dieta e atividade física podem influenciar os resultados. Além disso, **não é considerado um marcador precoce de lesão renal, pois a incapacidade de concentração da urina só ocorre quando há perda de cerca de 70% dos néfrons.**

MARCADORES PRECOSES: A IMPORTÂNCIA DO GAMA GT URINÁRIO NO DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA.

• Gama GT Urinário

A enzima Gama-glutamilttransferase (Gama GT) está presente na borda em escova dos túbulos proximais e alça de Henle dos néfrons e, fisiologicamente, não é filtrada pelos glomérulos e é encontrada em baixas concentrações na urina. **A elevação na concentração do Gama GT na urina indica lesão aguda do epitélio tubular, sendo considerado um marcador específico e precoce, além de ser simples, barato e de fácil execução.**

Para cães, além de ser considerado um marcador precoce da lesão renal, a Gama GT pode ser considerado um marcador persistente desse tipo de lesão (Greco et al., 1985; Rivers et al., 1996). A utilização de um agente nefrotóxico em um estudo experimental demonstrou que **o aumento da Gama GT Urinário ocorreu 4 dias após a indução da lesão renal, enquanto que a ureia e creatinina séricas somente apresentaram elevação após 7 dias.** Além da precocidade, o Gama GT na urina pode ser utilizado para informações importantes sobre a progressão da lesão tubular.

Em outro experimento conduzido por Oliveira e colaboradores (2004), cães foram submetidos à envenenamento crotálico e apresentaram aumento de Gama GT urinário com densidade urinária sem alterações, o que demonstrou a precocidade desse marcador. A urina dos animais também apresentou hematuria, glicosúria e proteinúria.

A Labtest desenvolveu em seu CDICT - Centro de Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia - o reagente **GAMA GT LIQUIFORM VET Ref. 1058**, que **além da mensuração do Gama GT no sangue, também permite a detecção do Gama GT na urina de cães e gatos.** O reagente Labtest foi comparado a outro método similar, apresentando correlação próxima a 100%.

Os intervalos de referência para cães e gatos estão descritos na Tabela 1. Estes valores devem ser usados apenas como orientação e recomenda-se que cada laboratório estabeleça sua própria faixa de valores de referência na população atendida.

GAMA GT URINÁRIO CORRIGIDO		
ESPÉCIE	CANINOS	13 – 92 U/L
	FELINOS	9 – 30 U/L

Tabela 1: Gama GT Urinário Corrigido

Referências Bibliográficas:

- ELLIOTT, J.; BARBER, P. J. Feline chronic renal failure: clinical findings in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995. *The Journal of Small Animal Practice*, v. 39, n. 2, p. 78-85, 1998.
- FREITAS, G. C.; VEADO, J. C. C.; CARREGARO, A. B. Evaluation tests of early renal injury in dogs and cats. *Semina: Ciências Agrárias*, v. 35, n.1, p. 411 - 426, 2014.
- GRAUER, G. F. Early detection of renal damage and disease in dogs and cats. *The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice*, v. 35, n. 3, p. 581-596, 2005.
- HENNEMANN, C. R. A.; SILVA, C. F.; SCHOENAU, W. et al. Urinary Gamma Glutamyl Transpeptidase activity, urinalysis, BUN and Creatinine serum dosages as a auxiliary diagnostic mean in dogs nephrotoxicity induced by aminoglycosides. *Ciência Rural*, v.27, n.2, p.237-244, 1997.
- LEES, G. E. Early diagnosis of renal disease and renal failure. *Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice*, v. 34, n. 4, p. 867-885, 2004.
- LUND, E. M.; ARMSTRONG, P. J.; KIRK, C. A. et. al. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 214, n. 9, p. 1336-1341, 1999.
- MELCHERT, A.; LAPOSY, C. B.; MOTTA, Y. P. et al. Gamaglutamyltranspeptidase urinária como indicador de insuficiência renal aguda induzida por gentamicina em cães. *Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR*, v. 10, n. 2, p. 111-116, 2007.
- POLZIN, D.J. Guidelines for conservatively treating chronic kidney disease. *Veterinary Medicine*, p.788- 799, 2007.
- STRASINGER, S. K. *Uroanálise e fuidos biológicos*. 3.ed. São Paulo: Editora Premier, 1996. 233p.
- THRALL, M. A.; WEISER, G. ROBIN, W.A., CAMPBELL, T.W. *Hematologia e bioquímica clínica veterinária*. 2. Ed, Roca, Rio de Janeiro, 678p.
- WATSON, A. D. Indicators of renal insufficiency in dogs and cats presented at a veterinary teaching hospital. *Australian Veterinary Practitioner*, v. 31, n. 2, p. 54-58, 2001.

labtest.com.br
SAC: 0800 031 3411
labtest@labtest.com.br

Labtest